

## SCHEDA TECNICA N° 8057-8058

# Z-STOP

### PRODOTTO CONTRO LE ZANZARE IN EMULSIONE LIQUIDA CONCENTRATA

#### COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono:

Succo d'aglio .....99,30 gr.

Acido citrico.....0,50 gr.

Potassio Sorbato .....0,20 gr.

#### SPETTRO D'AZIONE:

Il caratteristico odore dell'aglio risulta essere assai sgradito alle zanzare, le quali si tengono lontane dalle zone trattate anche quando il prodotto non è più percepibile dall'olfatto delle persone e degli altri animali, dotati di un apparato olfattivo molto meno sviluppato. **Z-STOP** esplica la sua azione anche contro altri insetti aventi ricettori estremamente sensibili al suo caratteristico odore come: lepidotteri (ricamatori, tignole, tottrici, minatori), tisanotteri (tripidi), rincoti (afidi, psilla, cicaline, cimici, aleurodidi, cocciniglie), ditteri (mosca dell'olivo, mosca della frutta), acari.

#### MODALITA' D'IMPIEGO:

**Z-STOP** è un liquido concentrato da emulsionare in acqua.

**Primi trattamenti (2 da effettuare con cadenza settimanale):** diluire al 2% (20 ml in 1 Lt d'acqua). Per migliorare l'adesività del prodotto e prolungare la sua efficacia nel tempo si consiglia di aggiungere al preparato 25 ml di **Synergy Barrier** per ogni litro di emulsione, agitando molto bene la soluzione.

**Trattamenti di mantenimento (cadenza quindicinale):** diluire al 2% (20 ml in 1 Lt d'acqua). Per migliorare l'adesività del prodotto e prolungare la sua efficacia nel tempo si consiglia di aggiungere al preparato 25 ml di **Synergy Barrier** per ogni litro di emulsione, agitando molto bene la soluzione.

Erogare la soluzione con le normali attrezzature irroratrici-nebulizzatrici.

Erogare 1 Lt di soluzione ogni 10 mq di superficie da trattare, preferendo per il trattamento i periodi della giornata meno soleggiati che vanno dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20.

Non erogare il prodotto nelle ore più calde della giornata. Evitare di eseguire il trattamento in giorni ventosi o in previsione di piogge. In caso di pioggia nelle successive 36-48 ore successive al trattamento bisogna ripetere il trattamento.

Si consiglia di aumentare i dosaggi al 3% in caso di alte infestazioni ed al 4% in caso di altissime infestazioni.

**Si consiglia un lavaggio accurato delle cisterne e delle pompe nebulizzatrici con aceto almeno una volta al mese.**

**AVVERTENZE:**

Simbologia di pericolo: NON CLASSIFICATO

Il prodotto è di origine naturale, non è tossico e non ha nessuna controindicazione per gli umani, gli animali e la vegetazione. Il suo tipico odore d'aglio scompare rapidamente e non determina sapori ed odori sgradevoli nelle piante e nei frutti trattati.

In caso di contatto accidentale con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua.

Non contiene principi attivi, additivi o solventi di origine chimica pertanto non danneggia l'entomofauna utile, ma allontana solo temporaneamente dalla coltura, pertanto si consiglia di effettuare i lanci degli insetti utili lontani dai trattamenti.

**CONFEZIONAMENTO:**

- Taniche da 10 Lt
- Flaconi da 1 Lt (12 pz)